

B.I.O.Sol

agilan® Diätergänzungsfuttermittel

Zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung.
Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen.
für Broiler und Masttruthühner

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale

Futtermittelzusatzstoffe der Funktionsgruppe „Darmflorastabilisatoren“
gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003.

Zusammensetzung

Laktose, Dextrose

Analytische Bestandteile

Rohprotein	68,4 %	Lysin	0,0 %
Rohasche	2,0 %	Methionin	0,0 %
Rohfett	0,1 %	Natrium	0,0 %
Rohfaser	0,3 %		

Gehalt an Zusatzstoffen je kg

Vitamine:

Betain aus Betainanhydrat (3a920) 910.000 mg

Darmflorastabilisatoren:

Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) (4b1707) 8,4 x 10¹¹ KBE

Fütterungsempfehlung

Brüterei: 200 g / Tag / 10.000 Eintagsküken (Geltropfenanwendung).

Applikation über das Trinkwasser: 600 g / 1.000 l

Empfohlene Fütterungsdauer

Anwendung während der ersten 3 Lebenstage (Transport, Einstallung) und später während weiterer Transport- und Umzugsphasen, für weitere 3 Tage. Vor Verwendung des Futtermittels oder vor Verlängerung seiner Verwendungsdauer ist der Rat eines Fütterungsexperten oder Tierarztes einzuholen.

Fütterungshinweis

Das Ergänzungsfuttermittel darf Futtermittelzusatzstoffe der Funktionsgruppe „Darmflorastabilisatoren“ in einer Konzentration von mehr als dem Einhundertfachen des entsprechenden festgelegten Höchstgehalts an Futtermittelzusatzstoffen in Alleinfuttermitteln enthalten. Fütterung bis zu 4 Wochen.

Kann in Mischfuttermitteln mit folgenden zugelassenen Kokzidiostatika eingesetzt werden: Semduramicin-Natrium, Diclazuril, Robenidin-Hydrochlorid, Maduramicin-Ammonium, Decoquinat, Lasalocid-Natrium und Halofuginon.

Lagerung

Halbbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühlere (< 25°C) und trockener Lagerung.

Hygroskopisch! Gebinde nach Gebrauch wieder verschließen!

Stand: Juni 2021

6929/K/06/21

